

SzGy06 - Készítse el a Cserszegi fűszeres, Cabernet Franc, Olaszrizling szőlőfajták morfológiai leírását !

Cserszegi fűszeres	Cabernet Franc	Olaszrizling
Fehér borszőlő Irsai olivér x Piros tramini 1960 Bakonyi Károly	Kék borszőlő, világfajta, Bordeaux-i borvidékről, Villányban a legelterjedtebb	Fehér borszőlő 100 éve terjedt el a Kárpátmedencében 1856-ban állami minősítést kapott
Tőke: Közepesen erős, közepesszámú, félmereven álló vesszők	Tőke: közepesen erős növekedésű, kis illetve közepes terméshozamú.	Tőke: Közepesen erős, sok, félmereven álló vesszők
Vessző: egyenes, barnás- bronz, középhosszú internódiumokkal	Vessző:	Vessző: vékony, egyenes, hosszú ízközű, szalmasárga, világosbarna csíkos
Levél: középnagy, ötszögletű, hosszabb mint széles, 5 karéj, vállöble nyílt, középzöld, fonáka szőrös	Levél: szabályos öt karéjú, kissé megnyúlt; a levélerek töve és a levélnyel pirosas színezetű..	Levél: középnagy/kicsi, változatosan tagolt, osztott/hasadt/karéjos, széle fűrész
Érett fürt: vállas, középnagy, közepesen tömött, 100-nál több bogyó	Fürtjei kicsik vagy közepesen nagyok, átlagosan 100 grammosak,	Érett fürt: kicsi, szárnyas, nagyon tömött, 115 bogyó/fürt
Bogyó: kicsi, picit megnyúlt gömbölyű, rózsaszín, éretten borostyánsárga, lédús, savas, fűszeres ízű	Bogyó: kis, gömbölyű, hamvas, sötétkék vékony héjú bogyói jellegzetesen fűzűek	Bogyó: kicsi, gömbölyű, sárgászöld, napos oldalon barnás, lédús, vékony héjú, édes, finomsavú
Bora: Megfelelő időben szüretelt termésének bora muskotályos illatú, fűszeres zamatú, harmonikus savtartalmú, extraktban gazdag, ami önmagában vagy házasított formában értékes lehet.	Bora kiváló, fajtajelleges, sokrétegű bor: az érett gyümölcsösség mellett kellemesen fanyar, nagy extrakt tartalmú, bársonyos, sötét bíbor színű ideális vörösbor.	Bora: Túlérett szőlőjéből különleges, minőségű borokat készítenek. Enyhén rezedaillatú, keserűmandula íz, elegáns savak. Nagy a magnézium tartalom, izomgörcsoldó.
A biztonságosan beérő termés cukortartalma eléri, sőt gyakran meghaladja a 18 mustfokot. A must savtartalma 8-10 g/l között változik, nem lágyl le. A téli fagyűrő, ezért a síkvidéki szőlőtermesztés megbízható fajtájává vált. A szárazságra érzékeny, A rothadásnak viszonylag ellenáll. Alkalmas a magasművelésű tőkeformákra, de a tőkék terhelésre ügyelni kell.. 6-8 rügy/négyzetméter rügyterheléssel kielégítően terem. Hosszúcsap ill. félszálvessző. Nem nevel sűrű lombot, mérsékelt zöldmunka	Késői érésű fajta, október első felében érik, cukortartalma általában magas. Fagyűrő képessége kitűnő, a betegségekre kevésbé hajlamos: ellenáll a lisztharmatnak és a rothadásnak.	Október első felében szüretelhető. Későn érő, ezért szereti a melegebb helyeket, a déli lejtőket. Bőven termő, kiváló minőségű fajta. Termése majdnem állandó minőségű, de a rothadás, a lisztharmat néha eléri.

